

123567

8

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

$$\frac{\partial}{\partial x} [Q(vz - wy)] = -\frac{K}{2} Q_x (vz - wy) + Q_z$$

$$p = \alpha + \frac{1}{2} K Q (vz - wy)$$

$$\bar{p} = \bar{\alpha} + \frac{1}{2} K Q (\bar{v}z - \bar{w}y) = \bar{\alpha} + \frac{1}{2} K Q z [\bar{m} + Q(\bar{y}x - \bar{\alpha}z)]$$

$$\bar{p} = \frac{1}{2} K (\bar{m}z - \bar{n}y) + \lambda + \frac{1}{2} K Q z [$$

$$-\frac{1}{2} K Q y]$$

Ho fatto il calcolo...
mi sono reso conto che...
il risultato è...
ed è...
il risultato è...

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{2} K (\bar{m}z - \bar{n}y) + \lambda$$

$$\bar{p} = \frac{1}{2} K (\bar{m}z - \bar{n}y) + \lambda + \frac{1}{2} K Q [x(\bar{\lambda}x + \bar{\mu}y + \bar{\nu}z) - \frac{1}{2} K (\bar{m}z - \bar{n}y)(x^2 + y^2 + z^2) - \bar{\lambda}(x^2 + y^2 + z^2)]$$

$$-\frac{1}{2} K Q (\bar{m}z - \bar{n}y) [\frac{1}{2} - Q]$$

Per i casi particolari...
in tutti i casi...
Napoli, dove mi sono...
solo per i due...

colle meno costose

Quel nome del re...
non solo per me, ma per...

Io in un gran pezzo...
fino ad oggi non...
Come mi è venuto dal...
Dopo il voto delle...
il piano...
vi sarebbe...
se ne accetto il...?

il voto...
se vi sono...
benvenuto...
più...
me la...?

io sono...
certo...
Error...
mi ne...
che...?

È un...
come a...
via da...
Dopo...
ne andò...!

del...
che il...
Napoli...
dove dal...
non solo per me, ma per...

S

~~Qu-~~

$$p = \alpha + \frac{1}{2} K Q (vz - wy)$$

$$X + (A-B) \frac{\partial \phi}{\partial x} + B \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$p_0 = \alpha_0 + \frac{1}{2} K Q_0 (v_0 z_0 - w_0 y_0) \quad z_1 (v_1 - v_0) - y_1 (v_1 - v_0)$$

$$p_1 = \alpha_1 + \frac{1}{2} K Q_1 (v z_1 - w y_1)$$

$$z_1 (v_1 - v) - y_1 (v_1 - v)$$

$$p_1 = \alpha_0 + \frac{1}{2} K [m_0(z_1 - z_0) - n_0(y_1 - y_0)] + \frac{1}{2} \int \left[\dots \right] \downarrow_{z_0, y_0} \begin{cases} l_0 = Q_0 (u_0 + v_0 y_0 - p_0 z_0) \\ m_0 = Q_0 (v_0 + \alpha_0 z_0 - p_0 x_0) \\ n_0 = Q_0 (w_0 + \beta_0 x_0 - \alpha_0 y_0) \end{cases}$$

$$+ \frac{1}{2} K Q_1 z_1 \left(\frac{m_0}{Q_0} + \gamma_0 x_1 - \alpha_0 z_1 - \frac{1}{4} K n_0 [(x_1 - x_0)^2 + \dots] + \frac{1}{2} K (y_1 - y_0) (l_0 x_1 + \dots) + \int (\xi' dx + \eta' dy + \zeta' dz) \right)$$

$$- \frac{1}{2} K Q_1 y_1 \left(\frac{n_0}{Q_0} + \alpha_0 y_1 - \beta_0 x_1 - \frac{1}{4} K n_0 [\dots] + \frac{1}{2} K (z_1 - z_0) (l_0 x_1 + \dots) + \int (\xi'' dx + \eta'' dy + \zeta'' dz) \right)$$

$$p_1 = \alpha_0 + \frac{1}{2} K [m_0(z_1 - z_0) - n_0(y_1 - y_0)] + \frac{1}{2} K \frac{Q_1}{Q_0} (m_0 z_1 - n_0 y_1) + \frac{1}{2} K Q_1 \left\{ x_1 (\alpha_0 x_1 + \beta_0 y_1 + \gamma_0 z_1) - \alpha_0 (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) \right\} - \frac{1}{8} K^2 Q_1 (m_0 z_1 - n_0 y_1) [(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2] + \frac{1}{4} K^2 Q_1 (z_0 y_1 - y_0 z_1) (l_0 x_1 + m_0 y_1 + n_0 z_1) + \frac{Q_1}{2} \int \left\{ \left[\frac{A}{Q_1} + K \frac{Q_1}{Q_1} (z_1 \xi' - y_1 \xi'') \right] dx + \left[\frac{B}{Q_1} + K \frac{Q_1}{Q_1} (z_1 \eta' - y_1 \eta'') \right] dy + \left[\frac{C}{Q_1} + K \frac{Q_1}{Q_1} (z_1 \zeta' - y_1 \zeta'') \right] dz \right\}$$

$$\frac{A}{Q_1} + K (z_1 \xi' - y_1 \xi'') = \frac{\partial q}{\partial y} - \frac{\partial h}{\partial z} - \frac{1}{2} K (y_1 - y) \frac{\partial m}{\partial x} + \frac{1}{2} K (z_1 - z) \frac{\partial m}{\partial x} + \frac{K}{4} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) \left(\frac{\partial q}{\partial y} - \frac{\partial h}{\partial z} \right) - \frac{K^2}{8} (y_1 - y) \frac{\partial m}{\partial x} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) + \frac{K^2}{8} (z_1 - z) \frac{\partial m}{\partial x} (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) +$$

$$+ \frac{K}{8} (z_1 \frac{\partial m}{\partial x} - y_1 \frac{\partial m}{\partial x}) + K \left[\left(\frac{\partial h}{\partial z} - \frac{\partial q}{\partial y} \right) (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) - x_1 \left\{ \left(\frac{\partial h}{\partial z} - \frac{\partial q}{\partial y} \right) x_1 + \left(\frac{\partial h}{\partial y} - \frac{\partial q}{\partial x} \right) z_1 + \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial h}{\partial z} \right) y_1 \right\} \right]$$

$$+ \frac{1}{2} K^2 Q \left\{ (z_1 y_1 - y_1 z_1) \omega_x - (x_1 - x) (z_1 \omega_y - y_1 \omega_z) \right\} - \frac{1}{4} K^2 (z_1 \frac{\partial m}{\partial x} - y_1 \frac{\partial m}{\partial x}) [(x_1 - x)^2 + \dots] +$$

$$+ \frac{1}{2} K^2 (z_1 y_1 - y_1 z_1) \left[(x_1 - x) \frac{\partial l}{\partial x} + (y_1 - y) \frac{\partial m}{\partial x} + (z_1 - z) \frac{\partial n}{\partial x} \right]$$