

$$\frac{x_0^2}{A} - \frac{x_0^2}{A^2} - \frac{y_0^2}{AB} - \frac{x_0 y_0^2}{A^2 B} - \frac{y_0^4}{AB^2}$$

$$- \frac{y_0^2}{AB} \left(1 + \frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)$$

$$\frac{x}{A} = \frac{-\frac{x_0}{A} \pm y_0 \sqrt{-\frac{1}{AB} \left(1 + \frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)}}{\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B}}$$

$$2y = 2y_0 \pm \sqrt{9y_0^2 + 8B}$$

$$2y = 2y_0 \pm \sqrt{H}$$

$$H = 9y_0^2 + 8B + 12Bx_0 \cdot \frac{-\frac{x_0}{A} \pm y_0 \sqrt{\dots}}{\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B}} - 4BA \frac{\frac{x_0^2}{A^2} - \frac{y_0^2}{AB} \left(1 + \frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right) \mp 2 \frac{x_0 y_0}{A} \sqrt{\dots}}{\left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)^2}$$

$$H \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)^2 = (9y_0^2 + 8B) \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)^2 - 12 \frac{B}{A} x_0^2 \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right) \pm 20Bx_0 y_0 \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right) \sqrt{\dots} - 4BA \left[\frac{x_0^2}{A^2} - \frac{y_0^2}{AB} \left(1 + \frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right) \mp 2 \frac{x_0 y_0}{A} \sqrt{\dots} \right]$$

$$H \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)^2 = (9y_0^2 + 8B) \left(\frac{x_0^4}{A^2} + \frac{y_0^4}{B^2} + 2 \frac{x_0^2 y_0^2}{AB} \right) - 12 \frac{B}{A^2} x_0^4 - 8 \frac{x_0^2 y_0^2}{A} \pm 20Bx_0 y_0 () \sqrt{\dots} + - 4 \frac{B}{A} x_0^2 + 4y_0^2 + 4 \frac{x_0 y_0^2}{A} + 4 \frac{y_0^4}{B}$$

$$H \left(\frac{x_0^2}{A} + \frac{y_0^2}{B} \right)^2 = 9y_0^2 \left(\frac{x_0^4}{A^2} + \frac{y_0^4}{B^2} + 2 \frac{x_0^2 y_0^2}{AB} \right) + 4 \frac{B}{A^2} x_0^4 + 8 \frac{y_0^4}{B} + 8 \frac{x_0^2 y_0^2}{A} \pm 20Bx_0 y_0 () \sqrt{\dots} + - 4 \frac{B}{A} x_0^2 + 4y_0^2 +$$

M. Pol, ne me comparez

- Rappel 1^{er} Memb - 2^o Labels - 3^e verbatim
- Invitation (1^{er} un peu) - Rappel Dedicace
- S. intr.
- Menu pour elle (Herminette, ...)
- Souffrances
- En Mal (écheve)
- Démonologie
- Jeon ~~at~~
- Sam ad'alt

$f(x,y) = a$
 a par + q'it n'ont
 n'importe en ...

le que signifie provisoire a diege

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x,y,a) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial a} = 0 \end{array} \right. \quad F(x,y) = 0$$

$$F(x,y) = f(x,y,a)$$

- Oubli-Vigier
 - " - Smith -

terrocal
 exigence

$$f'_a(x,y,a) = 0$$

~~$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial a} \frac{da}{dx} = 0$$~~

$$\frac{\partial f'_a}{\partial x} + \frac{\partial f'_a}{\partial y} y' + \frac{\partial f'_a}{\partial a} \frac{da}{dx} = 0$$

~~$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial a} \left[\frac{\partial f'_a}{\partial x} + \frac{\partial f'_a}{\partial a} \frac{da}{dx} \right] = 0$$~~

~~$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} y' + \frac{\partial^2 f}{\partial a^2} \frac{da}{dx} +$$~~

$\frac{\partial f}{\partial a}$ Genève
 $f(x,y,a)$ Genève
 Genève